

KATALOG PRODUKTÓW



2024

ZWIERZĘTA
TOWARZYSZĄCE



www.vetoquinol.pl
www.vetoquinol-vet.pl





przeciw
**W OCHRONIE
PRZECIWPASOŻYTNICZEJ
KOTÓW**



Felpreva® spot-on
z **nową** molekułą, by chronić koty

- Zwalczanie pcheł, kleszczy, roztoczy, nicieni płucnych i żołądkowo-jelitowych, tęgoryjców i tasiemców,
- Leczenie i profilaktyka pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych w jednym podaniu,
- Działa do **13 tygodni** przeciwko pchłom i kleszczom.



www.vetoquinol.pl

ANTYBIOTYKI

Cefaseptin®



Cefaseptin® 75 mg
tabletki dla psów i kotów

Cefaseptin® 300 mg
tabletki dla psów

Cefaseptin® 750 mg
tabletki dla psów



Substancja czynna: cefaleksyna

WSKAZANIA

Leczenie bakteryjnych zakażeń skóry (w tym głębokie i powierzchowne ropne zapalenie skóry) wywołane przez mikroorganizmy wrażliwe na cefaleksynę, w tym *Staphylococcus spp.*
Leczenie zakażeń układu moczowego.

DAWKOWANIE

15-30 mg / kg mc. 2 x dziennie, doustnie
Cefaseptin® 75 mg - 1 tabl. / 5 kg mc.
Cefaseptin® 300 mg - 1 tabl. / 20 kg mc.
Cefaseptin® 750 mg - 1 tabl. / 50 kg mc.

OPAKOWANIE

Cefaseptin® 75 mg, 300 mg - 100 tabl., blistry
Cefaseptin® 750 mg - 72 tabl., blistry



Clavaseptin®



Clavaseptin® 50 mg
smaczne tabletki
dla psów i kotów

Clavaseptin® 62,5 mg
smaczne tabletki
dla psów i kotów

Clavaseptin® 250 mg
smaczne tabletki
dla psów

Clavaseptin® 500 mg
smaczne tabletki
dla psów

Clavaseptin® 750 mg
smaczne tabletki
dla psów



Substancja czynna: amoksycylina, kwas klawulanowy

WSKAZANIA

U psów: leczenie lub leczenie wspomagające zakażeń przyzębia wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę w połączeniu z kwasem klawulanowym, tj. *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.* i *Escherichia coli*.
U kotów: leczenie zakażeń skóry (włączając rany i ropnie) wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę w połączeniu z kwasem klawulanowym, tj. *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* i *Escherichia coli*.

DAWKOWANIE

10 mg amoksycyliny/2,5 mg kwasu klawulanowego / kg mc. 2 x dziennie, doustnie

Clavaseptin® 50 mg psy i koty		Clavaseptin® 62,5 mg psy i koty		Clavaseptin® 250 mg psy		Clavaseptin® 500 mg psy		Clavaseptin® 750 mg psy	
Masa ciała (kg)	Liczba tabletek 2 x dziennie	Masa ciała (kg)	Liczba tabletek 2 x dziennie	Masa ciała (kg)	Liczba tabletek 2 x dziennie	Masa ciała (kg)	Liczba tabletek 2 x dziennie	Masa ciała (kg)	Liczba tabletek 2 x dziennie
1,0 – 2,0	½	1,0 – 2,5	½	8,1 – 10,	½	30,1 – 40	1	[>20 – 30]	½
2,1 – 4,0	1	2,6 – 5,0	1	10,1 – 20	1	40,1 – 60	1 ½	[30,1 – 45]	3/4
4,1 – 6,0	1 ½	5,1 – 7,5	1 ½	20,1 – 30	1 ½	60,1 – 80	2	[45,1 – 60]	1
6,1 – 8,0	2	7,6 – 10,0	2	30,1 – 10	2			[60,1 – 75]	1 ¼
								[75,1 – 90]	1 ½

OPAKOWANIE

Blister zawierający 10 tabletek.
Opakowanie 100 tabletek.



Marbocyl® P



Marbocyl® 5 mg
tabletki
dla psów i kotów

Marbocyl® 20 mg
tabletki dla psów

Marbocyl® 80 mg
tabletki dla psów



Substancja czynna: marbofloksacyna

WSKAZANIA

PSY:

- zakażenia skóry na tle: *Staphylococcus intermedius* i *Staphylococcus aureus* oraz bakterii Gram -ujemnych takich jak *P. multocida*, *P. aeruginosa* i *E. coli*;
- zakażenia układu oddechowego na tle: *Staphylococcus aureus* i *Staphylococcus intermedius* oraz bakterii Gram -ujemnych takich jak *P. multocida*, *P. aeruginosa* i *B. bronchoseptica*;
- zakażenia układu moczowego na tle: *Staphylococcus aureus* i *Staphylococcus intermedius* oraz bakterii Gram - ujemnych takich jak *E. coli*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*.

KOTY:

- zakażenia skóry na tle: *Staphylococcus intermedius* i *Staphylococcus aureus* oraz bakterii Gram -ujemnych takich jak *P. multocida* i *E. coli*;
- zakażenia układu oddechowego na tle: *Staphylococcus aureus* i *Staphylococcus intermedius* oraz bakterie Gram -ujemne takie jak *P. multocida*, *P. aeruginosa* i *B. bronchoseptica*.

DAWKOWANIE

2 mg / kg mc. 1 x dziennie, doustnie
Marbocyl® P 5mg: 1 tabletki/2,5 kg mc.
Marbocyl® P 20mg: 1 tabletki/10 kg mc.
Marbocyl® P 80mg: 1 tabletki/40 kg mc.

OPAKOWANIE

Marbocyl® P 5 mg - 10 tabletek
Marbocyl® P 20 mg - 10 tabletek
Marbocyl® P 80 mg - 12 tabletek



OTOLOGIA

Aurizon®



Krople do uszu, zawiesina dla psów

Substancja czynna: marbofloksacyna - 3 mg, klotrimazol - 10 mg, deksametazonu octan - 1 mg



WSKAZANIA

Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego wywołanego zarówno przez bakterie wrażliwe na marbofloksacynę, jak też przez grzyby, zwłaszcza *Malassezia pachydermatis*.

DAWKOWANIE

10 kropli głęboko do przewodu słuchowego zewnętrznego
1 x dziennie przez 7-14 dni.

OPAKOWANIE

10 ml, 20 ml



Oridermyl®



Maść do uszu dla psów i kotów

neomycyny siarczan - 3500 IU
nystatyna - 100000 IU triamcinolonu acetonid - 1 mg permetryna - 10 mg



WSKAZANIA	Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego u psów i kotów wywołanego przez grzyby, pasożyty i bakterie.
DAWKOWANIE	Podanie do ucha. Jedna kropla wielkości ziarna grochu 1 x dziennie do ustąpienia objawów. Zalecany czas leczenia - 21 dni (czas trwania cyklu piciowego <i>Otodectes cynotis</i>).
OPAKOWANIE	10 g, 30 g



Otifree



Roztwór do czyszczenia ucha zewnętrznego u psów i kotów

Nalewka z kwiatów nagietka (Tinctura Calendulae), olejek bazyliowy oraz związki oksyetylenowe w neutralnym, niedrażniącym dla uszu podłożu, o silnych właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych.
NIE ZAWIERA KONSERWANTÓW



PRZEZNACZENIE	Czyszczenie ucha zewnętrznego (zewnątrznego kanału słuchowego) u psów i kotów.
PODAWANIE	Metoda mycia ucha (H. Frede): należy wypełnić całkowicie kanał słuchowy roztworem; uchwycić elastyczne części kanału słuchowego za pomocą kciuka oraz palców środkowego i serdecznego, a następnie, wielokrotnie uciskając, masować ku górze w kierunku brzuszno-grzbietowym.
OPAKOWANIE	60 ml, 160 ml



Sonotix®



Normalizujący i przywracający równowagę preparat do czyszczenia uszu dla psów i kotów

Składniki: ethoxydiglycol, PEG - 8 caprylic /capric glycerides, capryloyl glycine, undecylenoyl glycine, tromethamine, polysorbate 80, glycerin, aqua.



PRZEZNACZENIE	Szybkie i skuteczne usuwanie woskowiny dzięki komplementarnemu składowi.
PODAWANIE	Raz w tygodniu lub tak często jak zalecił to lek. wet., lub przed aplikacją innych produktów.
OPAKOWANIE	120 ml, dwie kaniule do aplikacji



DERMATOLOGIA

Phovia



System Phovia - Terapia światłem dla zwierząt domowych - nowe podejście w dermatologii

Phovia to innowacyjny system od Vetoquinol, który stymuluje naturalne procesy biologiczne w skórze oraz jej mechanizmy naprawcze.

2-częściowy system do terapii chorób skóry: Lampa multi LED, zasilana bateryjnie służy do naświetlenia. Zestaw: żel nośnikowy oraz aktywne chromofory.



WSKAZANIA

Nowe rozwiązanie w leczeniu ran oraz chorób skóry u psów, kotów, koni

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW

Sesja 2 min. 2x/tydzień lub 4 min. 1 x raz/tydzień



Kerabol Biotin



Karma uzupełniająca dla psów i kotów

Skład: chlorek sodu, chlorek magnezu.

Dodatki w 1 kg: witaminy i prowitaminy: biotyna (D-biotyna) 1 604 mg, β -karoten (E160a) 1,50 mg; mieszanka pierwiastków śladowych: cynk (chelat cynku w połączeniu z aminokwasem, E6) 10 152 mg, mangan (chlorek manganu*4H₂O, E5) 3 208 mg, selen (selenin sodu, E8) 27 mg; aminokwasy i ich sole: DL-metionina, czysta technicznie (3c301) 10 692 mg Składniki analityczne: wilgotność 86%, białko surowe 4,2%, popiół surowy 1,7%, oleje i tłuszcze surowe 0,8%, włókno surowe 0,3%,



PRZEZNACZENIE

Karma uzupełniająca do stosowania przy nadmiernym wypadaniu włosów, łamliwej, matowej i suchej sierści. Połączenie biotyny z formułą Ipaligo (wysokowartościowe połączenie Zn z aminokwasami) poprawia jakość włosa, sierść staje się bardziej wytrzymała, gęsta, przybiera wyraźniejszą barwę i połysk, skraca okres linienia, poprawia pigmentację, wzmacnia poduszki i pazury oraz poprawia kondycję skóry.

PODAWANIE

Krople podawać z wodą do picia lub z karmą, w ilości:
1 kropla (0,04 ml)/kg m.c./dzień

OPAKOWANIE

20, 50 ml



ORTOPEDIA

Cimalgex®



Cimalgex® 8 mg
tabletki do żucia dla psów

Cimalgex® 30 mg
tabletki do żucia dla psów

Cimalgex® 80 mg
tabletki do żucia dla psów



Substancja czynna: cimikoksyb

WSKAZANIA

Leczenie bólu i zapalenia związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zwalczanie bólu okołoperacyjnego po zabiegach chirurgicznych ortopedycznych oraz tkanek miękkich u psów.

DAWKOWANIE

Podanie doustne z karmą lub na czczo.
2 mg / kg mc. 1 x dziennie.

OPAKOWANIE

Blistry aluminiowe zawierające 8 tabletek.
Cimalgex® - 8 mg -32 tabletki
Cimalgex® - 30 mg x 32 tabletki, x 144 tabletki
Cimalgex® - 80 mg x 32 tabletki, x 144 tabletki



Flexadin® Advanced PIES



Dla psów zmagających się z problemami z mobilnością

To unikalne połączenie UCII® niezdenaturowanego kolagenu typu II (występującego w chrząstkach stawowych) oraz kwasów bosweliiowych obecnych w roślinie Boswellia serrata.

O potwierdzonym, pozytywnym działaniu u psów



PRZEZNACZENIE

Zaawansowane przeciwdziałanie degradacji chrząstek stawowych u psów

PODAWANIE

Jeden kasek dziennie, dla każdego psa, niezależnie od masy ciała

OPAKOWANIE

30 lub 60 kaseków



Flexadin® Advanced KOT



Dla kotów zmagających się z problemami z mobilnością

Zawiera UCII(R) - niezdenaturowany kolagen typu II, otrzymywany w procesie niskotemperaturowym dla lepszego działania.



PRZEZNACZENIE

Zaawansowane przeciwdziałanie degradacji chrząstek stawowych u kotów

PODAWANIE

Jeden kasek dziennie, dla każdego kota, niezależnie od masy ciała

OPAKOWANIE

30 kaseków



Flexadin Adult Dog



Doroste psy powyżej 2. roku życia

Innowacyjny skład:

- UCII, niezdenaturowany kolagen typu II o unikalnym działaniu. Potwierdzone pozytywne działanie u psów
- kwasy Omega-3 - wspomagają zdrowie stawów
- witamina E - znana z właściwości przeciwutleniających



PRZEZNACZENIE

Neutralizacja procesów degradacji chrząstki

PODAWANIE

Tylko jeden kasek niezależnie od masy ciała

OPAKOWANIE

60 kąsków



Flexadin Young Dog Maxi Flexadin Young Dog Mini



Młode psy poniżej 2. roku życia

Kompletna kompozycja składników: chlorowodorek glukozaminy i siarczan chondroityny, czarci pazur, witamina E, kwasy Omega-3, mangan



PRZEZNACZENIE

Wzmocnienie struktury chrząstki

PODAWANIE

Do podawania tylko raz dziennie

OPAKOWANIE

60 kąsków



Flexadin Cat



Koty

Kompletna kompozycja składników: chlorowodorek glukozaminy i siarczan chondroityny, czarci pazur, witamina E, kwasy Omega-3, mangan



PRZEZNACZENIE

Wzmocnienie struktury chrząstki

PODAWANIE

Do podawania tylko raz dziennie

OPAKOWANIE

60 kąsków





Caniviton® Forte Plus



Karma uzupełniająca dla psów i kotów

Składniki: chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny, mielony korzeń Harpagophytum procumbens



PRZEZNACZENIE

Wspomaganie funkcji chrząstki stawowej

PODAWANIE

Tabletki należy podawać bezpośrednio do pyska lub z pokarmem. Podawać zgodnie z zaleceniem żywieniowym.

Masa ciała psa	Do 30 kg	30 - 60 kg	Powyżej 60 kg
Liczba tabletek/dzień	1	1½	2

OPAKOWANIE

30 tabl., 90 tabl.



Caniviton® Protect



Karma uzupełniająca dla psów i kotów

Składniki: chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny



PRZEZNACZENIE

Wspomaganie funkcji chrząstki stawowej

PODAWANIE

Tabletki należy podawać bezpośrednio do pyska lub z pokarmem. Podawać zgodnie z zaleceniem żywieniowym.

Masa ciała psa	Do 30 kg	30 - 60 kg	Powyżej 60 kg
Liczba tabletek/dzień	1	1½	2

OPAKOWANIE

30 tabl., 90 tabl.



PARAZYTOLOGIA

Fecasol/Fecalyzer

Zestaw 50 pojemników + 650 ml roztwór saletry chilijskiej



WSKAZANIA

Zestaw do badania kału metodą flotacji

OPAKOWANIE

Fecasol 650 ml
Fecalyzer 50 pojemników



Dolpac®



DOLPAC® tabletki
dla małych psów 1-6 kg



DOLPAC® tabletki
dla średnich psów 5-20 kg



DOLPAC® tabletki
dla dużych psów 20-75 kg



Substancje czynne: oksantel, pyrantel, prazykwantel

WSKAZANIA

Zwalczanie u psów mieszanych inwazji następujących dorosłych stadiów nicieni i tasieńców.
Nicienie: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*.
Tasieńce: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*.

Zalecana dawka wynosi 20 mg oksantelu / 5 mg pyrantelu / 5 mg prazykwantelu na kg masy ciała, tj. jedna tabletka w pojedynczym podaniu doustnym. Korzystnie jest przegłodzić psy przed leczeniem. Karma może być podana po ponad godzinie, po leczeniu.

DAWKOWANIE

DOLPAC® - małe psy

DOLPAC® - średnie psy

DOLPAC® - duże psy

Masa ciała psa	Liczba tabletek	Masa ciała psa	Liczba tabletek	Masa ciała psa	Liczba tabletek
1 kg	½	od 3,1 do 5 kg	½	od 10,1 do 12,5 kg	½
od 1,1 do 2 kg	1	od 5,1 do 10 kg	1	od 12,6 do 25 kg	1
od 2,1 do 4 kg	2	od 10,1 do 20 kg	2	od 25,1 do 50 kg	2
od 4,1 do 6 kg	3	od 20,1 do 30 kg	3	od 50,1 do 75 kg	3

Tabletki można dzielić na pół.
Psy utrzymywane razem lub z jednej psiarni powinny być leczone jednocześnie.

OPAKOWANIE

DOLPAC® tabletki dla małych psów 1-6 kg – 60 tabl.
DOLPAC® tabletki dla średnich psów 5-20 kg – 60 tabl.
DOLPAC® tabletki dla dużych psów 20-75 kg – 60 tabl.



Felpreva



Roztwór do nakrapiania dla kotów

Substancje czynne: tigolaner, emodepsyd, prazykwantel



WSKAZANIA	Koty: mieszane zakażenia/inwazje pasożytnicze lub narażone na ich wystąpienie. Zwalczanie inwazji pcheł (<i>Ctenocephalides felis</i>) i kleszczy (<i>Ixodes ricinus</i> , <i>Ixodeshaleocylus</i>) U kotów przy zapewnieniu natychmiastowego i trwałego działania bójczonego przez 13tygodni.			
DAWKOWANIE	Zalecane dawki: 14,4 mg tigolaneru/kg mc., 3 mg emodepsydu/kg mc., 12 mg prazykwantelu/kg mc. Równoważne: 0,148 ml produktu/kg mc.			
OPAKOWANIE				
	Objętość dawki jednostkowej (ml)	Tigolaner	Emodepsyd	Prazykwantel
Małe koty (1,0 - 2,5 kg)	0,37ml	36,22 mg	7,53 mg	30,12 mg
Średnie koty (> 2,5 - 5 kg)	0,74ml	72,45 mg	15,06 mg	60,24 mg
Duże koty (> 5 - 8 kg)	1,18ml	115,52 mg	24,01 mg	96,05 mg



Dronspot® dla małych kotów (od 0,5 do 2,5kg)



Krople do nakrapiania na skórę spot-on / KOT

Każda pipetka 0,35 ml zawiera: Substancje czynne: prazykwantel 30 mg, emodepsyd 7,5 mg, Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E320) 1,89 mg



WSKAZANIA	Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki <u>robaków obłych</u> i <u>robaków płaskich</u> : <u>Robaki obłe (niciansie)</u> • <i>Toxocara cati</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3) • <i>Toxocara cati</i> (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo • <i>Toxascaris leonina</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) • <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4). <u>Robaki płaskie (tasiemce)</u> : • <i>Dipylidium caninum</i> (postaci dojrzałe i niedojrzałe) • <i>Taenia taeniaeformis</i> (postaci dojrzałe) • <i>Echinococcus multilocularis</i> (postaci dojrzałe)	
DAWKOWANIE	Kot od 0,5 do 2,5 kg	
OPAKOWANIE	2 x 0,35 ml	



Dronspot® dla średnich kotów (od 2,5 do 5kg)



Krople do nakrapiania na skórę spot-on / KOT

Każda pipetka 0,70 ml zawiera: Substancje czynne: prazykwantel 60 mg, emodepsyd 15 mg, Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E320) 3,78 mg



WSKAZANIA	Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki <u>robaków obłych</u> i <u>robaków płaskich</u> : <u>Robaki obłe (niciansie)</u> • <i>Toxocara cati</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3) • <i>Toxocara cati</i> (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo • <i>Toxascaris leonina</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) • <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4). <u>Robaki płaskie (tasiemce)</u> : • <i>Dipylidium caninum</i> (postaci dojrzałe i niedojrzałe) • <i>Taenia taeniaeformis</i> (postaci dojrzałe) • <i>Echinococcus multilocularis</i> (postaci dojrzałe)	
DAWKOWANIE	Kot od 2,5 do 5 kg	
OPAKOWANIE	2 x 0,7 ml	



Dronspot® dla dużych kotów (od 5 do 8kg)



Krople do nakrapiania na skórę spot-on / KOT

Każda pipetka 1,12 ml zawiera: Substancje czynne: prazykwantel 96 mg, emodepsyd 24 mg
Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E320) 6,05 mg



WSKAZANIA

Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich: Robaki obłe (nicieńce): • *Toxocara cati* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3)
• *Toxocara cati* (stadia larwalne L3) – leczenie kociąt w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo • *Toxascaris leonina* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
• *Ancylostoma tubaeforme* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4). Robaki płaskie (tasiemce):
• *Dipylidium caninum* (postaci dojrzałe i niedojrzałe) • *Taenia taeniaeformis* (postaci dojrzałe)
• *Echinococcus multilocularis* (postaci dojrzałe)

DAWKOWANIE

Kot od 5 do 8 kg

OPAKOWANIE

2 x 1,12 ml



Drontal® Junior



Zawiesina doustna / PIES

1 ml zawiesiny zawiera: febantel 15 mg, embonian pyrantelu 14,4 mg



WSKAZANIA

Zwalczanie inwazji pasożytniczych nicień, t.j.: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, u szczeniąt i młodych psów.

DAWKOWANIE

1 ml zawiesiny doustnej na 1 kg m.c.

OPAKOWANIE

50 ml



Drontal® Dog Flavour 2 tabl.



Tabletka podzielna na 2 części (kształt kości) / PIES

Każda tabletka zawiera: Substancje czynne: 150 mg febantelu, 50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu 50 mg prazykwantelu



WSKAZANIA

Zwalczanie inwazji nicień i tasiemców przewodu pokarmowego psów, t.j.: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Dipylidium caninum*, *Mesocestoides spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*.
Zwalczanie inwazji pierwotniaków *Giardia spp.*

DAWKOWANIE

1 tabletka na 10 kg m.c.

OPAKOWANIE

2 tabl.



Drontal® Dog Flavour 10 kg (4 x 6 tabl.)



Tabletka podzielna na 2 części (kształt kości) / PIES

Każda tabletka zawiera: Substancje czynne: 150 mg febantelu, 50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu, 50 mg prazykwantelu



WSKAZANIA	Zwalczanie inwazji <u>nicieni i tasiemców</u> przewodu pokarmowego psów, t.j.: <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Taenia spp.</i> , <i>Multiceps multiceps</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Mesocostoides spp.</i> , <i>Echinococcus granulosus</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> . Zwalczanie inwazji <u>pierwotniaków</u> <i>Giardia spp.</i>
DAWKOWANIE	1 tabletka na 10 kg m.c.
OPAKOWANIE	4 x 6 tabl.



Drontal® Plus Flavour 35 kg



Tabletka podzielna na 2 części / PIES

Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg, pyrantelu embonian 504 mg, prazykwantel 175 mg



WSKAZANIA	Zwalczanie inwazji <u>nicieni i tasiemców</u> przewodu pokarmowego psów, t.j.: <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Taenia spp.</i> , <i>Multiceps multiceps</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Mesocostoides spp.</i> , <i>Echinococcus granulosus</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> . Zwalczanie inwazji <u>pierwotniaków</u> <i>Giardia spp.</i>
DAWKOWANIE	1 tabletka na 35 kg m.c.
OPAKOWANIE	2 tabl.



Drontal® Dog Flavour XL (35 kg, 4 x 6 tabl.)



Tabletka podzielna na 2 części (kształt kości) / PIES

Każda tabletka zawiera: Substancje czynne: 150 mg febantelu, 50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu, 50 mg prazykwantelu



WSKAZANIA	Zwalczanie inwazji <u>nicieni i tasiemców</u> przewodu pokarmowego psów, t.j.: <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Taenia spp.</i> , <i>Multiceps multiceps</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Mesocostoides spp.</i> , <i>Echinococcus granulosus</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> . Zwalczanie inwazji <u>pierwotniaków</u> <i>Giardia spp.</i>
DAWKOWANIE	1 tabletka na 35 kg m.c.
OPAKOWANIE	4 x 6 tabl.



Drontal® kot 1x2 tab.



Tabletka owalna podzielna na 2 części / KOT

Jedna tabletka zawiera: pyrantelu embonian 230 mg, prazykwantel 20 mg



WSKAZANIA	Zwalczanie inwazji <u>nicieni i tasiemców</u> przewodu pokarmowego kotów, t.j.: <i>Toxocara cati</i> , <i>Ancylostoma tubaeforme</i> , <i>Ancylostoma braziliense</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Taenia taeniaeformis</i> , <i>Mesocostoides spp.</i> , <i>Joyeuxiella spp.</i>
DAWKOWANIE	1 tabletka na 4 kg m.c.
OPAKOWANIE	2 tabl.



Profender® Spot-on dla małych kotów (do 2,5 kg)



Krople do nakrapiania na skórę spot-on KOT

Każda pipetka 0,35 ml zawiera: Substancje czynne: prazykwantel 30 mg, emodepsyd 7,5 mg
Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E320) 1,89 mg



WSKAZANIA	Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki <u>robaków obłych i robaków płaskich</u> : <u>Robaki obłe (nicienie)</u> - <i>Toxocara cati</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3) - <i>Toxocara cati</i> (stadia larwalne L3) - leczenie kociąt w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo - <i>Toxascaris leonina</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) - <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) <u>Robaki płaskie (tasiemce)</u> - <i>Dipylidium caninum</i> (postaci dojrzałe i niedojrzałe) - <i>Taenia taeniaeformis</i> (postaci dojrzałe) - <i>Echinococcus multilocularis</i> (postaci dojrzałe) <u>Nicienie płucne</u> - <i>Aelurostrongylus abstrusus</i> (postaci dojrzałe)
DAWKOWANIE	Kot od 0,5 do 2,5 kg
OPAKOWANIE	2 x 0,35 ml



Profender® Spot-on dla średnich kotów (od 2,5 do 5kg)



Krople do nakrapiania na skórę spot-on KOT

Każda pipetka 0,70 ml zawiera: Substancje czynne: prazykwantel 60 mg, emodepsyd 15 mg
Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E320) 3,78 mg



WSKAZANIA	Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki <u>robaków obłych i robaków płaskich</u> : <u>Robaki obłe (nicienie)</u> - <i>Toxocara cati</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3) - <i>Toxocara cati</i> (stadia larwalne L3) - leczenie kociąt w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo - <i>Toxascaris leonina</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) - <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) <u>Robaki płaskie (tasiemce)</u> - <i>Dipylidium caninum</i> (postaci dojrzałe i niedojrzałe) - <i>Taenia taeniaeformis</i> (postaci dojrzałe) - <i>Echinococcus multilocularis</i> (postaci dojrzałe) <u>Nicienie płucne</u> - <i>Aelurostrongylus abstrusus</i> (postaci dojrzałe)
DAWKOWANIE	Kot od 2,5 do 5 kg
OPAKOWANIE	2 x 0,70 ml



Profender® Spot-on dla dużych kotów (od 5 do 8kg)



Krople do nakrapiania na skórę spot-on KOT

Każda pipetka 1,12 ml zawiera: Substancje czynne: prazykwantel 96 mg, emodepsyd 24 mg
Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol (E320) 6,05 mg



WSKAZANIA

Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich:

Robaki obłe (nicienie)

- *Toxocara cati* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3)
- *Toxocara cati* (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo
- *Toxascaris leonina* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
- *Ancylostoma tubaeforme* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)

Robaki płaskie (tasiemce)

- *Dipylidium caninum* (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
- *Taenia taeniaeformis* (postaci dojrzałe)
- *Echinococcus multilocularis* (postaci dojrzałe)

Nicienie płucne

- *Aelurostrongylus abstrusus* (postaci dojrzałe)

DAWKOWANIE

Kot od 5 do 8 kg

OPAKOWANIE

2 x 1,12 ml



Profender® Tabletki dla psów 10 kg



Tabletka podzielna na 2 części (kształt kości) PIES

Każda tabletka produktu Profender zawiera: Substancje czynne: emodepsyd: 10 mg, prazykwantel: 50 mg



WSKAZANIA

Zwalczanie lub zapobieganie mieszanym inwazjom pasożytniczym u psów powodowanym przez następujące gatunki pasożytów:

Robaki obłe (nicienie)

- *Toxocara canis* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4 i L3)
- *Toxascaris leonina* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)
- *Ancylostoma caninum* (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
- *Uncinaria stenocephala* (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
- *Trichuris vulpis* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)

Robaki płaskie (tasiemce)

- *Dipylidium caninum*
- *Taenia spp.*
- *Echinococcus multilocularis* (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
- *Echinococcus granulosus* (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

DAWKOWANIE

1 tabletka na 10 kg m.c.

	Emodepsyd	Prazykwantel
Profender tabletki dla małych psów	3 mg	15 mg
Profender tabletki dla średnich psów	10 mg	50 mg
Profender tabletki dla dużych psów	30 mg	150 mg

OPAKOWANIE

4 x 6 tabl.



Profender® Tabletki dla psów 30 kg



Tabletka podzielna na 2 części (kształt kości) PIES

Każda tabletka produktu Profender zawiera: Substancje czynne: emodepsyd: 30 mg, prazykwantel: 150 mg



WSKAZANIA

Zwalczanie lub zapobieganie mieszanym inwazjom pasożytniczym u psów powodowanym przez następujące gatunki pasożytów:
Robaki obłe (nicienie):
Toxocara canis (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4 i L3)
Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)
Ancylostoma caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Uncinaria stenocephala (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Trichuris vulpis (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)
Robaki płaskie (tasiemce):
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Echinococcus granulosus (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

DAWKOWANIE

1 tabletka na 30 kg m.c.

	Emodepsyd	Prażykwantel
Profender tabletki dla małych psów	3 mg	15 mg
Profender tabletki dla średnich psów	10 mg	50 mg
Profender tabletki dla dużych psów	30 mg	150 mg

OPAKOWANIE

2 tabl.



Procox® 0,9 mg /ml + 18 mg/ml



Zawiesina doustna dla psów

1 ml zawiera: Substancje czynne: emodepsyd 0,9 mg, toltrazuryl 18 mg



WSKAZANIA

Do stosowania u psów z podejrzeniem lub stwierdzonym mieszanym zarażeniem pasożytami wywołanym przez robaki obłe i kokcydia poniższych gatunków:

Robaki obłe (nicienie):

- *Toxocara canis* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4)
- *Uncinaria stenocephala* (postać dojrzała)
- *Ancylostoma caninum* (postać dojrzała)
- *Trichuris vulpis* (postać dojrzała)

Kokcydia:

- *Isospora ohioensis* complex
- *Isospora canis*

Procox zapobiega skutecznie replikacji *Isospora*, a także wydalaniu oocyst.

DAWKOWANIE

Zalecana dawka minimalna wynosi 0,5 ml/kg masy ciała (m.c.), co odpowiada 0,45 mg emodepsydu / kg m.c. i 9 mg toltrazurylu / kg m.c.

OPAKOWANIE

7,5 ml





KARDIOLOGIA/NEFROLOGIA/UROLOGIA

Prilium®



PRILIUM® 75 mg
Proszek do sporządzania
roztworu doustnego
dla psów



PRILIUM® 150 mg
Proszek do sporządzania
roztworu doustnego
dla psów



Substancja czynna: imidaprilu chlorowodorek

WSKAZANIA

U psów: leczenie umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca, wywołanej przez niedomykalność zastawki dwudzielnej lub przez kardiomiopatię rozstrzeniową.

DAWKOWANIE

Przed użyciem fiolek z proszkiem należy uzupełnić wodą do zaznaczonego miejsca. Po rozpuszczeniu roztwór należy zużyć w ciągu 77 dni i przechowywać go w lodówce. Stosować 1x dziennie doustnie, z pokarmem lub bezpośrednio do pyska.

PRILIUM® 75 mg 1ml/10 kg mc.

PRILIUM® 150 mg 1ml/20 kg mc.

OPAKOWANIE

Pudełko z fiolką zawierającą proszek wraz z 2 ml strzykawką.



UpCard®



UpCard® 0,75 mg
tabletki dla psów

UpCard® 3 mg
tabletki dla psów

UpCard® 7,5 mg
tabletki dla psów



Substancja czynna: torasemid

WSKAZANIA

Do leczenia klinicznych objawów, w tym obrzęków i wysięków, związanych z zastoinową niewydolnością serca.

DAWKOWANIE

Zalecana dawka torasemidu wynosi 0,1 do 0,6 mg na kg mc. 1 x dziennie, doustnie. Jeśli poziom diurezy wymaga zmiany, dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w ramach zalecanego zakresu dawkowania o 0,1 mg/kg mc. Gdy objawy zastoinowej niewydolności serca są pod kontrolą i pacjent jest ustabilizowany, a jest wymagane długoterminowe leczenie moczopędne tym produktem, należy stosować najniższą skuteczną dawkę.

OPAKOWANIE

UpCard® 10 tabletek w blisterze.
- dla 0,75 i 3 mg - 30 i 100 tabl. (blistry)
- 7,5 mg - 100 tabl. (blistry)



Ipakitine®



Karma uzupełniająca dla psów i kotów



PRZEZNACZENIE	Wspomaganie funkcji nerek.
PODAWANIE	1g / 5 kg m.c. – dwa razy dziennie, po wymieszaniu z karmą. Dołączona miarka zawiera odpowiednio ok. 1 g i ok. 2 g Ipakitine®
OPAKOWANIE	60 g, 180 g

Opakowanie:	ok. 1 miesiąc/m.c.:
IPAKITINE® 60 g	5 kg
IPAKITINE® 180 g	15 kg



Rubenal® 75, 300



RUBENAL® 75

Karma uzupełniająca psy,
koty - tabletki



RUBENAL® 300

Karma uzupełniająca psy,
koty - tabletki



WSKAZANIA	Wspomaganie funkcji nerek.
DAWKOWANIE	Rubenal® 75 Kot > 2 kg 1 tabl. 2 x dziennie Pies < 3 kg ½ tabl. 2 x dziennie Pies 3-6 kg 1 tabl. 2 x dziennie Pies 6 – 10 kg 2 tabl. 2 x dziennie Rubenal® 300 - Pies 8-12 kg m. c. ½ tabl. 2 x dziennie 13-25 kg m. c. 1 tabl. 2 x dziennie 26-45 kg m. c. 2 tabl. 2 x dziennie >45 kg m. c. 3 tabl. 2 x dziennie Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia. Zalecany czas stosowania - początkowo do 6 miesięcy.
OPAKOWANIE	Rubenal® 75 : 60 tabl. Rubenal® 300 : 60 tabl.



Uro-Pet®



Karma uzupełniająca dla psów i kotów

Skład: substancje zakwaszające mocz: DL-metionina.



PRZEZNACZENIE	Smaczna pasta zakwaszająca mocz wspomagająca zdrowie dróg moczowych.
PODAWANIE	<u>KOTY:</u> 1/2 - 1 łyżeczki (3-6 g) 2 x dziennie <u>PSY:</u> 1/2 - 3 łyżeczek 2 lub 3 x dziennie Zalecany czas stosowania: do 6 miesięcy.
OPAKOWANIE	Tuba 120 g



Propalin® 40 mg/ml



Syrop

Substancja czynna: chlorowodorek fenylopropanolaminy



WSKAZANIA

Leczenie nietrzymania moczu związanego z niewydolnością zwieracza cewki moczowej u suk.

DAWKOWANIE

1 mg/kg mc. 3 x dziennie w karmie, co odpowiada 0,1 ml preparatu Propalin® Syrop /5 kg mc. 3 x dziennie.

OPAKOWANIE

100 ml, opakowanie zawiera butelkę z adapterem oraz strzykawkę



ANESTEZJOLOGIA

Bioketan



Bioketan, 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Substancja czynna: ketamina - 100 mg
(w postaci ketaminy chlorowodorku - 115,33 mg)



WSKAZANIA

Stosować w celu poskramiania i uspokajania zwierząt przed badaniami, przed zabiegami kosmetycznymi, zabiegami lekarskimi.
Jako anestetyk chirurgiczny przy krótkich zabiegach niewymagających zwiotczenia mięśni szkieletowych i niewywołujących silnego bólu trzewnego.
W połączeniu z innymi środkami (miorelaksacyjnymi, przeciwbólowymi, innymi anestetykami lub neuroleptykami) w celu uzyskania pełnej narkozy chirurgicznej.

DAWKOWANIE

Psy: 3 mg ketaminy/kg m.c. dożylnie;
5 - 10 mg ketaminy/kg m.c. domięśniowo.
Koty: 5-10 mg ketaminy/kg m.c. domięśniowo;
10-15 mg/kg m.c. domięśniowo dla zwierząt w złym stanie ogólnym.

OPAKOWANIE

Butelki zawierające 10 ml produktu pakowane są pojedynczo lub po 10 w pudełka tekturowe.
Butelki zawierające 50 ml produktu pakowane są pojedynczo w pudełka tekturowe.

Lek do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii.



Sedalin® gel 350 mg/10 ml



Żel doustny dla psów i koni

Substancja czynna: acepromazyna 350 mg/10 ml



WSKAZANIA

Psy: Sedacja: wyeliminowanie reakcji obronnych zwierząt podczas krępowania lub badania, nerwowość, sytuacje stresowe, nadmierne napięcie mięśni oraz transport. Premedykacja w anestezji oraz terapia objawowa przy wymiotach i chorobie lokomocyjnej podczas długotrwałych podróży. Sedacja i zwiótczenie mięśni.

Konie: Sedacja: wyeliminowanie reakcji obronnych zwierząt podczas krępowania lub badania, nerwowość, sytuacje stresowe, nadmierne napięcie mięśni oraz transport. Premedykacja w anestezji oraz terapia objawowa przy chorobie lokomocyjnej podczas długotrwałych podróży.

Podanie doustne. Końcówkę dozownika należy wprowadzić do kieszeni policzkowej zwierzęcia i wycisnąć z opakowania żądaną ilość leku.

DAWKOWANIE

Psy:

słaba sedacja:

1,0 mg acepromazyny/kg m.c.

0,5 ml produktu/17,5 kg m.c.

średnia sedacja:

2,0 mg acepromazyny/kg m.c.

1,0 ml produktu/17,5 kg m.c.

głęboka sedacja:

3,0 mg acepromazyny/kg m.c.

1,5 ml produktu/17,5 kg m.c.

Konie:

słaba sedacja:

0,1-0,2 mg acepromazyny / kg m.c.

2-3 ml produktu/500 kg m.c.

średnia sedacja:

0,3-0,4 mg acepromazyny / kg m.c.

4-6 ml produktu/500 kg m.c.

OPAKOWANIE

10 ml

Lek do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii.



Xylapan® 20 mg/ml



Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, psów i kotów

Substancja czynna: ksylazyna



WSKAZANIA

Sedacja, analgezja i zwiótczenie mięśni w celu poskromienia zwierząt nerwowych, ułatwienia załadunku i transportu, ułatwienia przeprowadzenia badania klinicznego (np. badanie rektalne, badanie rentgenowskie, badanie prącia, strzyków, jamy ustnej), zabiegów leczniczych (np. zabiegi dentystyczne, zakładanie sondy nosowo-żołądkowej) lub premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi.

DAWKOWANIE

Bydło - podaje się domięśniowo

Dawka ksylazyny wynosi 5–30 mg (co odpowiada 0,25–1,5 ml preparatu Xylapan)/100 kg m.c.

w zależności od pożądanego stopnia sedacji.

Bardzo agresywne zwierzęta wymagają wyższych dawek, nie przekraczających 15 mg/50 kg m.c.

Konie - podaje się w powolnej iniekcji dożylniej (trwającej jedną do dwóch minut).

Dawkowanie zależy od pożądanego stopnia sedacji i reakcji zwierzęcia

i wynosi 3–5 ml preparatu Xylapan/100 kg m.c.

Koty - podaje się domięśniowo w dawce 0,15 ml/kg m.c.

(3,0 mg ksylazyny/kg m.c.).

Psy - jest podawany domięśniowo w dawce 0,05–0,15 ml/kg m.c.

(1–3 mg ksylazyny/kg m.c.).

OPAKOWANIE

butelka ze szkła 50 ml



BEHAVIORYZM

Zylkene®



(Zylkene® 75 mg)
Zylkene® ≤10kg

(Zylkene® 225 mg)
Zylkene® 10-30kg

(Zylkene® 450 mg)
Zylkene® 15-60kg



Zawiera naturalny, uspokajający peptyd otrzymywany z mleka - hydrolizat trypsynowy alfa-kazeiny bydlęcej

Karma uzupełniająca dla psów i kotów przejawiających nadmierny niepokój

PRZEZNACZENIE

Pomaga w łagodzeniu niepokoju / przywracaniu stanu odprężenia u psów i kotów w występujących często lub codziennie sytuacjach będących źródłem stresu.

PODAWANIE

Karma uzupełniająca do podawania doustnego.
Zalecaną ilość należy zastosować w trakcie jednego podania.
Kapsułkę otworzyć i proszek wymieszać z karmą lub ze smakołykiem.
Rozpocząć podawanie 1 – 2 dni przed przewidywanym zdarzeniem lub zmianą w otoczeniu.
Niektóre zwierzęta mogą wymagać wcześniejszego rozpoczęcia podawania (5 – 7 dni).
Dawkę dobową można zwiększyć po konsultacji z lekarzem weterynarii lub członkiem personelu medycznego.

	(Zylkene® 75 mg)	(Zylkene® 225 mg)	(Zylkene® 450 mg)
Nowe opakowania	Zylkene® ≤10kg	Zylkene® 10-30kg	Zylkene® 15-60kg
Psy i koty ≤5kg	1 kapsułka na dobę		
Psy 5-10 kg	2 kapsułki na dobę		
Psy 10-15 kg		1 kapsułka na dobę	
Psy 15-30 kg		2 kapsułki na dobę	1 kapsułka na dobę
Psy 30-60 kg			2 kapsułki na dobę

OPAKOWANIE

10 blistrów po 10 kapsulek (100 kapsulek w opakowaniu)



POZOSTAŁE

Bezo-Pet®



Karma uzupełniająca dla kotów ułatwiająca kontrolowanie tworzenia się bezoarów włosowych

Skład: sól, olej sojowy, syrop glukozowy, melasa z trzciny cukrowej, olej z ryb.



PRZEZNACZENIE

Ułatwia kontrolowanie tworzenia się bezoarów włosowych u kotów.
Zalecane do rutynowego stosowania u kotów ras długowłosych oraz u kotów utrzymywanych w domu.

PODAWANIE

W obecności bezoarów: 1 łyżeczka (6g) dziennie.
Zapobieganie: 1 łyżeczka (6g) 2-3 razy w tygodniu.

OPAKOWANIE

Tuba 120 g





Karma uzupełniająca dla psów i kotów

Składniki analityczne: tłuszcz surowy 27,5% (3,3% omega-3 i 13,7% omega-6), wilgotność 15,1%, włókno surowe 5,2%, popiół surowy 0,3%, białko 0,5%.

Dodatki/kg: Dodatki dietetyczne: wit. A 135 000 j.m., wit. D3 10 000 j.m., wit. E/octan alfa-tokoferylu 900 mg, wit. B1/chlorowodorek tiaminy 280 mg, wit. B2/chlorowodorek pirydoksyny 2 mg, wit. B6 130 mg, wit. B12/cyjanokobalamina 330 pg, mangan (siarczan manganu(II) jednowodny) 170 mg, żelazo (siarczan żelaza(II) siedmiowodny) 95 mg, jod (jodek potasu) 85 mg



PRZEZNACZENIE

Polecana do stosowania w okresach wzmożonego zapotrzebowania żywieniowego np. forsowna aktywność fizyczna, wystawy zwierząt, niedożywienie, zmniejszony apetyt, laktacja.

PODAWANIE

- PSY (na 10 kg mc.) 1 łyżka stołowa (18 g) dziennie
- KOTY (na 3-5 kg mc.) 1 łyżeczka (6 g) dziennie

OPAKOWANIE

Tuba 120 g

Enisyl F®



Karma uzupełniająca dla kotów

Skład: sorbitol, olej z ryb, olej sojowy.

Składniki analityczne: wilgotność (maks.) 55,3%, białko surowe (min.) 24%, tłuszcz surowy (min.) 7,2%, popiół surowy 1%, włókno surowe (maks.) 1%, sól 0,097%.



PRZEZNACZENIE

Dobre samopoczucie kotów

PODAWANIE

Dorośle koty: 1-2 ml – dwa x dziennie
Kocięta: 1 ml – dwa x dziennie
Każde naciśnięcie pompki podaje 1 ml pasty.

OPAKOWANIE

100 ml

DZIAŁ LOGISTYKI SPRZEDAŻY I BIURO OBSŁUGI KLIENTA

EWA MILUN	DYREKTOR DS. LOGISTYKI SPRZEDAŻY	tel. 607-440-320	ewa.milun@vetoquinol.com
EMILIA PRUSINOWSKA	OBSŁUGA HURTOWNI WETERYNARYJNYCH	tel. 95 728-55-37	emilia.prusinowska@vetoquinol.com
ANGELIKA CZERWIŃSKA	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-03	angelika.czerwinska@vetoquinol.com
MACIEJ CYBULSKI	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-08	maciej.cybulski@vetoquinol.com
AGNIESZKA KOLIŃSKA	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-09	agnieszka.kolinska@vetoquinol.com
MARTYNA KRYSIAK	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-01	martyna.krysiak@vetoquinol.com
REMIGIUSZ PIĄTKOWSKI	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-06	remigiusz.piatkowski@vetoquinol.com
PIOTR STOPYRA	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-07	piotr.stopyra@vetoquinol.com
KATARZYNA TYMSZAN	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-04	katarzyna.tymczasan@vetoquinol.com
DOROTA JEZIEJSKA	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 788-79-02	dorota.jezierska@vetoquinol.com

ZOOLOGIA

KATARZYNA RUTECKA	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	tel. 95 782-84-57	katarzyna.rutecka@vetoquinol.com
IWONA SZULŻYCKA	SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH	Tel. 95 782-84-28	iwona.szulzycka@vetoquinol.com

KIEROWNICY TERYTORIALNI

POLSKA PÓŁNOCNA			
KRZYSZTOF STAŃCZAK	KIEROWNIK RYNKU	603 941 273	krzysztof.stanczak@vetoquinol.com
JUSTYNA SKOWROŃSKA	KIEROWNIK TERYTORIALNY	609 048 841	justyna.skowronska@vetoquinol.com
JUSTYNA WYKOWSKA	KIEROWNIK TERYTORIALNY	607 273 223	justyna.wykowska@vetoquinol.com
ADAM AMBROZIAK	KIEROWNIK TERYTORIALNY	607 280 463	adam.ambroziak@vetoquinol.com
AGATA WŁODARCZYK	KIEROWNIK TERYTORIALNY	603 870 071	agata.wlodarczyk@vetoquinol.com
MICHAŁ LANKAUF	KIEROWNIK TERYTORIALNY	697 200 890	michal.lankauf@vetoquinol.com
WOJCIECH PIECUŁA	KIEROWNIK TERYTORIALNY	601 965 849	wojciech.piecula@vetoquinol.com
POLSKA POŁUDNIOWA			
MICHAŁ NAGÓRSKI	KIEROWNIK RYNKU	601 965 846	michal.nagorski@vetoquinol.com
EWA DOMINIAK	KIEROWNIK TERYTORIALNY	603 870 540	ewa.dominiak@vetoquinol.com
EDYTA ŚLEDŹ	KIEROWNIK TERYTORIALNY	607 403 884	edyta.sledz@vetoquinol.com
PAWEŁ KOCÓJ	KIEROWNIK TERYTORIALNY	609 509 059	pawel.kocoj@vetoquinol.com
MICHAŁ MŁODNICKI	KIEROWNIK TERYTORIALNY	607 280 459	michal.mlodnicki@vetoquinol.com
RENATA KWAŚNIEWSKA	KIEROWNIK TERYTORIALNY	601 261 002	renata.kwasniewska@vetoquinol.com
PAULINA ZWIERZYŃSKA	KIEROWNIK TERYTORIALNY	601 785 300	paulina.zwierzynska@vetoquinol.com
SEBASTIAN ŚMIETANA	KIEROWNIK TERYTORIALNY	693 364 297	sebastian.smietana@vetoquinol.com
KIEROWNICY DS KLIENTÓW KLUCZOWYCH			
MAGDALENA DZIWIŚIŃSKA	ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE zasięg ogólnopolski	605 501 351	magdalena.dziwisinska@vetoquinol.com
TOMASZ NEMŚ	E-COMMERCE zasięg ogólnopolski	601 965 844	tomasz.nems@vetoquinol.com
MAŁGORZATA MICHAŚ	ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE zasięg ogólnopolski	607 403 886	malgorzata.michas@vetoquinol.com



www.vetoquinol.pl



www.vetoquinol-vet.pl

Copyright©2024 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. • Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część katalogu nie może być reprodukowana ani przekazywana w żadnej formie bez pisemnej zgody Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Informacje zawarte w katalogu nie zwalniają od obowiązku zapoznania się z treścią ulotek dołączonych do produktu.

Katalog ma charakter informacyjny. Charakterystyka produktów leczniczych weterynaryjnych dostępna jest na www.vetoquinol.pl

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wlkp.

PHOVIA

Światło w leczeniu chorób skóry

Nowe
rozwiązanie
w dermatologii
weterynaryjnej...

Świetlna
terapia[®]



Świetlna terapia[®]

to fotobiomodulacja poprawiająca stan zdrowia skóry!
Udowodniono naukowo, że przyspiesza regenerację skóry!¹
Jest bezinwazyjną i bezpieczną procedurą.

Choroba skóry u zwierząt domowych może być dużym problemem.
To długi okres leczenia, cierpienie i dyskomfort zwierzaka i pozornie niekończące się oczekiwanie
by jego opiekun mógł go znów z radością przytulać i głaskać.
Phovia nowe rozwiązanie w dziedzinie dermatologii.

¹ www.phovia.pl

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER